

## TRATTAMENTO ERADICANTE PER L'HELICOBACTER Pylori

<b>Terapia di I linea</b>			
	<b>Modalità di assunzione</b>		<b>Durata</b>
Omeprazolo 20mg	1cp prima di colazione	1cp prima di cena	14 giorni
Amoxicillina 1g.	1cp dopo colazione	1cp dopo cena	14 giorni
Metronidazolo 250mg	2cp dopo colazione	2cp dopo cena	14 giorni
Claritromicina 500mg	1cp dopo colazione	1cp dopo cena	14 giorni

<b>Terapia di II linea</b>					
	<b>Modalità di assunzione</b>				<b>Durata</b>
Omeprazolo 20mg	1cp prima di colazione		1cp prima di cena		
Pylera	3cp dopo colazione	3cp dopo pranzo	3cp dopo cena	3cp prima di coricarsi	10 giorni

<b>Terapia di III linea</b>			
	<b>Modalità di assunzione</b>		<b>Durata</b>
Omeprazolo 20mg	1cp prima di colazione	1cp prima di cena	14 giorni
Amoxicillina 1g.	1cp dopo colazione	1cp dopo cena	14 giorni
Levofloxacina 250mg	1cp dopo pranzo	1cp dopo cena	14 giorni

<b>Alternativa in pazienti ALLERGICI a penicilina</b>			
	<b>Modalità di assunzione</b>		<b>Durata</b>
Omeprazolo 20mg	1cp prima di colazione	1cp prima di cena	10 giorni
Metronidazolo 250mg	2cp dopo colazione	2cp dopo cena	10 giorni
Claritromicina 500mg	1cp dopo colazione	1cp dopo cena	10 giorni